

	Goed	fout	N.v.t.
Werkwijze:			
- plaatst verzorgingswagen handig en goed bereikbaar	☐	☐	☐
- ontbloot het onderlichaam, mits zorg voor privacy.(molton!)	☐	☐	☐
- plaatst de urinezakhouder naast het bed	☐	☐	☐
- haalt eerste steriel veld uit blister	☐	☐	☐
- legt dit steriel open met werkboord.	☐	☐	☐
- legt in KV veld m.b.v. KV AP:			
- KV handschoenen	☐	☐	☐
- KV katheter met binnenverpakking	☐	☐	☐
- KV urinecollector	☐	☐	☐
- legt het glijmiddel op werkboord!	☐	☐	☐
- legt spuit met balloninhoud in handbereik op werkboord.	☐	☐	☐
- giet Chloorhexidine®0,02 % in recipiënt in blister	☐	☐	☐
- geeft de pat. een perineale houding	☐	☐	☐
- legt cellulose onderlegger tss. benen	☐	☐	☐
- plaatst blister tss. benen pat.	☐	☐	☐
- legt KV kompres geopend in handbereik: naast patiënt of op Abdomen	☐	☐	☐
- doet kiemarme handschoenen aan	☐	☐	☐
- doet steriel penistoilet als volgt:			
- Schuift voorhuid naar achter	☐	☐	☐
- ontsmet de urethramond	☐	☐	☐
- ontsmet de glanspenis	☐	☐	☐
- ontsmet circulair rond voorhuid	☐	☐	☐
- eindigt ontsmettend op de urethraopening.	☐	☐	☐
- blijft penis vasthouden en neemt glijmiddel	☐	☐	☐
- houdt penis verticaal	☐	☐	☐
- laat eerst wat glijmiddel op de urethramond vallen	☐	☐	☐
- brengt de spuitconus geheel in de urethramond	☐	☐	☐
- drukt de instillagel® dan langzaam leeg	☐	☐	☐
- drukt de urethra hierbij zachtjes dicht achter de glanspenis	☐	☐	☐
- legt 2de KV kompres <u>onder</u> penis	☐	☐	☐
- legt de gebruikte watten in de blister	☐	☐	☐
- doet handschoenen uit en samen met blister in afvalzak	☐	☐	☐
→ - Ontsmet de handen opnieuw	☐	☐	☐
- trekt KV handschoenen aan volgens de voorschriften	☐	☐	☐
- neemt de katheter uit zijn steriele binnenverpakking	☐	☐	☐
- verbindt katheter en urinecollector in werkveld!!	☐	☐	☐
- legt katheter voorzichtig terug neer in KV veld	☐	☐	☐
- brengt 2de KV veld tss. benen van pat.	☐	☐	☐
- neemt katheter + collector samen uit veld	☐	☐	☐
- legt collector op KV veld in bed	☐	☐	☐
- houdt penis eerst verticaal (=onsteriele hand)	☐	☐	☐

	Goed	Fout	N.v.t.
- brengt punt van de katheter in één keer in de urethra, bij Tiemann® katheter wijst de punt naar boven	☐	☐	☐
- houdt penis daarna horizontaal naar de neus bij evt. weerstand	☐	☐	☐
- brengt de katheter tot aan de splitsing in	☐	☐	☐
- houdt ballonuiteinde stevig omhoog tussen duim en wijsvinger	☐	☐	☐
- fixeert katheter tijdens het vullen van de ballon	☐	☐	☐
- trekt katheter terug tot achter de sfincter.(voelt weerstand)	☐	☐	☐
- hangt urinezakje in houder, lager dan de stuit van pat.	☐	☐	☐

* Nazorg:

- droogt bilnaad bij pat.	☐	☐	☐
- schuift voorhuid terug!	☐	☐	☐
- legt leiding urinecollector boven of onder been van pat. afhankelijk van procedure van ZH	☐	☐	☐
- kleeft katheter vast op het abdomen of bovenbeen van pat.	☐	☐	☐
- installeert pat. in een goede houding.	☐	☐	☐
- helpt patiënt evt. met aankleden	☐	☐	☐
- vraagt pat.:			
- hoe hij de behandeling ervaren heeft	☐	☐	☐
- of hij nog vragen heeft	☐	☐	☐
informeert patiënt:			
- dat er tijdelijk nog aandrang kan zijn om te urineren	☐	☐	☐
- dat hij veel moet drinken (1,5L/24u)	☐	☐	☐
- ruimt materiaal op.	☐	☐	☐
- brengt de kamer in orde	☐	☐	☐
- ontsmet handen	☐	☐	☐

* Verslag:

- vermeldt dat pat. een blaaskatheter heeft	☐	☐	☐
- “ de balloninhoud	☐	☐	☐
- “ hoe de katheterisatie is verlopen	☐	☐	☐
- geeft de ervaringen van de pat. weer.	☐	☐	☐
- “ het resultaat (debiet)	☐	☐	☐
- meldt belangrijke observatiepunten.	☐	☐	☐

AANDACHTSPUNTEN:

De inhoud van de sondagesetten kunnen verschillen ngl. de instellingen! Controleer of je apart steriele materialen moet meenemen.

Als de steriele handschoenen in de blister nog in een verpakking zitten, haalt men dit met een KV AP uit de blister, neemt het over in zijn handen en legt het op het nachtkastje van de patiënt. Men kan deze dan vandaar aantrekken.