

Naam uitvoerende student:
Naam observerende student:

Datum:

De student:

Goed Fout N.v.t.

- kan het doel van het katheteriseren weergeven
- kent de **maat** van de te vervangen katheter
- kent de capaciteit van de ballon
- doet juwelen uit
- ontsmet de **HANDEN!**
- gaat na of patiënt is ingelicht
- informeert de pat. over doel en werkwijze
- informeert patiënt over gebruik van (anesthetisch glijmiddel)
- gaat na of het IT al gedaan is.

De student:

- verzamelt:
 - ev. materiaal voor het intiem toilet
 - **materiaal voor het verwijderen van de verblijfskatheter:**
 - kiemarme handschoenen
 - nierbekken of afvalzak
 - spuit, grootte afhankelijk van de balloninhoud
 - **materiaal voor het inbrengen van een verblijfskatheter:**
 - katheterisatie set (blisters)
 - Thiemann- Foley® kath. + reservekatheter
 - spuit voor balloninhoud: steriel water!
 - KV urinecollector
 - Chloorhexidine 0,02 %
 - KV glijmiddel in spuit.
 - reserve KV handschoenen
 - reserve KV kocher. of afsluitdopje (evt. te gebruiken bij 2de poging met reserve katheter)
 - 2 KV kompr. 10 x 8 cm
 - urinezakhouder
 - kiemarme handschoenen
 - verzorgingswagen + afvalzak
 - molton + onderlegger
 - kleefpleister
 - trekt de juiste hoeveelheid ballonvloeistof op
 - opent flesje Chloorhexidine® 0,02 % op voorhand

	Goed	fout	N.v.t.
<u>Werkwijze:</u>			
- plaatst verzorgingswagen handig en goed bereikbaar	☐	☐	☐
- ontbloot het onderlichaam, mits zorg voor privacy (molton!)	☐	☐	☐
Verwijderen van de katheter:			
- plaatst nierbekken opzij of tussen benen van patiënt	☐	☐	☐
- trekt kiemarme handschoenen aan	☐	☐	☐
- maakt urinecollector leeg	☐	☐	☐
- neemt spuit en laat ballon af	☐	☐	☐
- spuit $\pm 0,5$ cc terug in, zodat scherpe randen verdwijnen	☐	☐	☐
- verwijderd de katheter voorzichtig	☐	☐	☐
- trekt handschoen over katheter en verwijderd het geheel	☐	☐	☐
- verwijderd nierbekken of afvalzak	☐	☐	☐
→ - ontsmet hnd opnieuw	☐	☐	☐
Voert zo nodig een intiem toilet uit!			
Plaatsen nieuwe katheter:			
- haalt eerste steriel veld uit blister	☐	☐	☐
- legt dit steriel open met werkboord.	☐	☐	☐
- legt in KV veld m.b.v. KV AP:			
- KV handschoenen	☐	☐	☐
- KV katheter met binnenverpakking	☐	☐	☐
- KV urinecollector	☐	☐	☐
- legt het glijmiddel op werkboord!	☐	☐	☐
- legt spuit met balloninhoud in handbereik op werkboord.	☐	☐	☐
- giet Chloorhexidine®0,02% in recipiënt in blister	☐	☐	☐
- geeft de pat. een perineale houding	☐	☐	☐
- legt cellulose onderlegger tss. benen	☐	☐	☐
- plaatst blister tss. benen pat.	☐	☐	☐
- legt KV kompr. geopend in handbereik: naast patiënt of op abdomen	☐	☐	☐
- doet kiemarme handschoenen aan	☐	☐	☐
- doet steriel penistoilet als volgt:			
- schuift voorhuid naar achter	☐	☐	☐
- ontsmet de urethramond	☐	☐	☐
- ontsmet de glanspenis	☐	☐	☐
- ontsmet circulair rond voorhuid	☐	☐	☐
- eindigt ontsmettend op de urethraopening (aparte depper!)	☐	☐	☐
- blijft penis vasthouden en neemt glijmiddel	☐	☐	☐
- houdt penis verticaal	☐	☐	☐
- laat eerst wat glijmiddel op de urethramond vallen	☐	☐	☐
- brengt de spuitconus geheel in de urethramond	☐	☐	☐

	Goed	Fout	N.v.t.
- drukt de instillagel® dan langzaam leeg	☐	☐	☐
- drukt de urethra hierbij zachtjes dicht achter de glanspenis	☐	☐	☐
- legt een KV kompres <u>onder</u> penis	☐	☐	☐
- legt de gebruikte watten in de blister	☐	☐	☐
- doet handschoenen uit en samen met blister in afvalzak	☐	☐	☐
- trekt KV handschoenen aan volgens de voorschriften	☐	☐	☐
→ - ontsmet handen opnieuw	☐	☐	☐
- neemt de katheter uit zijn steriele binnenverpakking	☐	☐	☐
- verbindt katheter en urinecollector in werkveld!!	☐	☐	☐
- legt katheter voorzichtig terug neer in KV veld	☐	☐	☐
- brengt 2de KV veld tss. benen van pat.	☐	☐	☐
- neemt katheter + collector samen uit veld	☐	☐	☐
- legt collector op KV veld in bed	☐	☐	☐
- houdt penis eerst verticaal (=onsteriele hand)	☐	☐	☐
- brengt punt van de katheter in één keer in de urethra, de punt wijst naar boven	☐	☐	☐
- houdt penis daarna horizontaal naar de neus bij evt. weerstand	☐	☐	☐
- brengt de katheter tot aan de splitsing in	☐	☐	☐
- houdt ballonuiteinde stevig omhoog tussen duim en wijsvinger	☐	☐	☐
- fixeert katheter door ballon op te spuiten.	☐	☐	☐
- trekt katheter terug tot achter de sfincter.(voelt weerstand)	☐	☐	☐
- hangt urinezakje in houder, lager dan de stuit van pat.	☐	☐	☐

*** Nazorg:**

- droogt bilnaad bij pat.	☐	☐	☐
- schuift voorhuid terug!	☐	☐	☐
- legt leiding urinecollector boven of onder been van pat. ngl. afspraken op dienst!	☐	☐	☐
- kleeft katheter vast op het abdomen of bovenbeen van pat.	☐	☐	☐
- installeert pat. in een goede houding.	☐	☐	☐
- helpt patiënt evt. met aankleden	☐	☐	☐
- vraagt pat:			
- hoe hij de behandeling ervaren heeft	☐	☐	☐
- of hij nog vragen heeft	☐	☐	☐
- informeert patiënt:			
- dat er tijdelijk nog aandrang kan zijn om te urineren	☐	☐	☐
- dat hij veel moet drinken (1,5 L/24 u)	☐	☐	☐
- ruimt materiaal op.	☐	☐	☐
- brengt de kamer in orde	☐	☐	☐
- meet de hoeveelheid urine uit het vorige opvangzakje	☐	☐	☐
- ontsmet handen	☐	☐	☐

*** Verslag:**

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - vermeldt dat pat. een nieuwe verblijfskatheter heeft | ☐ | ☐ | ☐ |
| - “ de balloninhoud | ☐ | ☐ | ☐ |
| - “ hoe de katheterisatie is verlopen | ☐ | ☐ | ☐ |
| - noteert het urinedebiet vanuit de vorige urinezak | ☐ | ☐ | ☐ |
| - geeft de ervaringen van de pat. weer. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - “ het resultaat (debiet) | ☐ | ☐ | ☐ |
| - meldt belangrijke observatiepunten. | ☐ | ☐ | ☐ |

AANDACHTSPUNTEN:

De inhoud van de sondagesetten kunnen verschillen ngl. de instellingen! Controleer of je apart steriele materialen moet meenemen.

Als de steriele handschoenen in de blister nog in een verpakking zitten, haalt men dit met een KV AP uit de blister, neemt het over in zijn handen en legt het op het nachtkastje van de patiënt. Men kan deze dan vandaar aantrekken.