

Datum:

Goed Fout N.v.t.

[illegible][illegible]

	Goed	Fout	N.v.t.
<u>Werkwijze:</u>			
- plaatst verzorgingswagen handig en goed bereikbaar	☐	☐	☐
- ontbloot het onderlichaam, mits zorg voor privacy	☐	☐	☐
- Opent blister:			
- Haalt eerste veld steriel uit blister	☐	☐	☐
- legt dit steriel open met werkboord.	☐	☐	☐
- legt in KV veld m.b.v. KV AP:			
- KV handschoenen	☐	☐	☐
- KV korte Nelaton® katheter	☐	☐	☐
- KV glijmiddel in spuit of:	☐	☐	☐
- minipakje uitduwen in hoek van KV veld.	☐	☐	☐
- neemt laboreciënt:			
- maakt deksel los	☐	☐	☐
- zet dit recipiënt op de werkboord in handbereik	☐	☐	☐
- giet Chloorhexidine® 0,02 % in recipiënt in blister	☐	☐	☐
- plaatst bedpan of molton + cellulose	☐	☐	☐
- geeft gynaecologische houding aan pat.	☐	☐	☐
- plaatst blister tss benen pat.	☐	☐	☐
- doet kiemarme handschoenen aan	☐	☐	☐
- doet steriel vulvatoilet :			
- 1 watten prop voor Li en Re grote schaamlip	☐	☐	☐
- kleine schaamlippen: id.	☐	☐	☐
- urethraopening: laatste watten prop op urethra laten	☐	☐	☐
- de gebruikte watten worden in de blister gelegd	☐	☐	☐
- doet blister samen met de handschoenen in afvalzak	☐	☐	☐
- ontsmet de handen opnieuw	☐	☐	☐
- trekt KV handschoenen aan volgens de voorschriften	☐	☐	☐
- brengt 2de KV veld tss benen van pat.	☐	☐	☐
- brengt glijmiddel in d.m.v. spuit, of	☐	☐	☐
- neemt katheter met R hand en wrijft punt katheter in met KY-gel	☐	☐	☐
- houdt de schaamstreek gespreid (=onsteriele hand)	☐	☐	☐
- katheter rustig inbrengen: ongeveer 8cm.	☐	☐	☐
- als urine afloopt, katheter overnemen in L hand en dichtknijpen	☐	☐	☐
- KV urinestaal nemen :			
- urinereciënt nemen (deksel op werkboord laten)	☐	☐	☐
- laat ± 20 cc urine aflopen en knijpt katheter terug dicht	☐	☐	☐
- plaatst recipiënt + deksel terug op werkboord	☐	☐	☐
- trekt katheter uit en legt ze in blister	☐	☐	☐

Goed Fout N.v.t.

*** Nazorg:**

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - droogt bilnaad bij pat. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - installeert pat. in een goede houding. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - helpt patiënt ev. met aankleden | ☐ | ☐ | ☐ |
| - vraagt patiënt: | | | |
| - hoe zij de behandeling ervaren heeft | ☐ | ☐ | ☐ |
| - of zij nog vragen heeft | ☐ | ☐ | ☐ |
| - ruimt materiaal op. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - brengt de kamer in orde | ☐ | ☐ | ☐ |
| - ontsmet handen | ☐ | ☐ | ☐ |
|
- zorgt voor het urinestaal: | | | |
| - ev. urine optrekken in vacutainer buisje | ☐ | ☐ | ☐ |
| - naam, Kn° en afnamewijze op staal noteren | ☐ | ☐ | ☐ |
| - samen met aanvraagbon naar labo sturen | ☐ | ☐ | ☐ |

*** Verslag:**

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - vermeldt hoe de katheterisatie is verlopen | ☐ | ☐ | ☐ |
| - noteert de ervaringen van de pat. | ☐ | ☐ | ☐ |
| - meldt belangrijke observatiepunten. | ☐ | ☐ | ☐ |

Aandachtspunten:

Minipakje KY-gel mogen enkel gebruikt worden bij de vrouw voor éénmalige katheterisatie en wanneer het niet de eerste keer is dat de vrouw gesondeerd wordt en niet na de menopauze.