

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

| |
|---------------------------------|
| Aanprikken poortkatheter |
|---------------------------------|

score

Degene die de handeling uitvoert

goed

fout

Vorbereiding

De student:

| | | |
|--|---|---|
| - kan het doel van het aanprikken benoemen | 0 | 0 |
| - kan mogelijke complicaties benoemen | 0 | 0 |
| - zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne (haren bijeen, zuivere schort) | 0 | 0 |
| - wint informatie in over de patiënt en de toe te dienen zorgen | 0 | 0 |
| - doet juwelen uit | 0 | 0 |
| - wast / ontsmet de handen | 0 | 0 |
| - verzamelt de benodigdheden: | | |
| - Steriele handschoenen | 0 | 0 |
| - Chloorhexidine 0,5 % in alcohol 70 % | 0 | 0 |
| - 1 grippernaald | 0 | 0 |
| - 3-wegkraan | 0 | 0 |
| - KV afsluitdopje | 0 | 0 |
| - flacon Heparine (500 IE/5 ml) of (100 IE/1 ml) | 0 | 0 |
| - 1 of 2 ampullen 10 ml NaCl 0,9 % | 0 | 0 |
| - Handalcohol | 0 | 0 |
| - Wondzorgset | 0 | 0 |
| - zelfklevend verband (bv. Tegaderm®) | 0 | 0 |
| - kleefpleister | 0 | 0 |
| - extra pincet | 0 | 0 |
| - nierbekken | 0 | 0 |
| - bereidt de kamer voor | | |

Uitvoering

| | | |
|--|---|---|
| - licht de patiënt in | 0 | 0 |
| - respecteert de privacy van de patiënt | 0 | 0 |
| - installeert de patiënt in een liggende of halfzittende houding | 0 | 0 |
| - ontsmet de handen | | |
| - ontsmet het werkveld | | |
| - Opent de ampullen met NaCl 0.9 % en met heparine-oplossing (gebruik bij een glazen ampul een droge steriele kompres als bescherming) | 0 | 0 |
| - Opent de blister en leg het steriel werkveld open | 0 | 0 |

| Degene die de handeling uitvoert | goed | fout |
|--|------|------|
| - neemt een extra steriele pincet en legt 2 kompressen in het veld | 0 | 0 |
| - legt de andere steriele benodigdheden in het werkveld | | |
| - spuit van 10 ml | 0 | 0 |
| - optreknaald | 0 | 0 |
| - grippernaald | 0 | 0 |
| - 3-wegkraan | 0 | 0 |
| - Tegaderm® pleister | 0 | 0 |
| - Overgiet de kompressen in de blister met alcohol | 0 | 0 |
| - doet steriele handschoenen aan | 0 | 0 |
| - Maakt de spuiten op steriele wijze klaar: | | |
| - koppelt naald op spuit, trekt heparine-oplossing op en ontluicht spuit. | | |
| Ontkoppelt de naald | 0 | 0 |
| - koppelt naald op spuit, trekt NaCl 0,9% op en ontluicht spuit. | | |
| Ontkoppelt de naald | 0 | 0 |
| - Koppelt poortsysteemnaald en de 3-wegkraan aan mekaar en plaatst de spuit met NaCl 0,9 % hierop | 0 | 0 |
| - ontluicht het poortnaaldsysteem en de zijkraan van de 3-wegkraan en laat de spuit eraan gekoppeld. | 0 | 0 |
| - Laat de naaldhuls om de poortsysteemnaald zitten. Leg het geheel terug op het steriele werkveld. | 0 | 0 |
| - legt het geheel terug op het steriele veld | 0 | 0 |
| - Desinfecteer de huid die over de injectiekamer ligt met de kompressen gedrenkt in alcoholische oplossing; werk hierbij met een spiraalvormige beweging van het midden naar buiten. Laat gedurende 1 minuut drogen. | 0 | 0 |
| - Neem de poortsysteemnaald (met de aangekoppelde spuit met NaCl 0,9%) in de hand waarmee wordt aangeprikt en verwijder de beschermhuls. Houdt de vleugeltjes tussen duim en wijsvinger en houdt de spuit goed vast in je handpalm | 0 | 0 |
| - Vraag nu aan de patiënt om naar de andere kant te kijken of op zijn hand te blazen om negatieve druk te creëren (Valsalva manoeuvre). | 0 | 0 |
| - Fixeert de injectiekamer tussen duim en wijsvinger en prik deze aan. Drukt de naald stevig door de huid en het rubber van de injectiekamer heen totdat de punt de bodem van de injectiekamer raakt. | 0 | 0 |
| - Controleert de ligging en de doorgankelijkheid van het poortsysteem door bloed op te zuigen. Flusht het poortsysteem met NaCl 0,9%. | | |
| - Heft afklemming van het slangetje aan de poortsysteemnaald op. | 0 | 0 |
| - Trekt de zuiger van de spuit iets terug om te zien of bloed terugstroomt. | 0 | 0 |
| - Spuit met NaCl 0,9% het slangetje schoon. | 0 | 0 |
| - Klemt het slangetje af en verwijder de lege spuit. | 0 | 0 |

| Degene die de handeling uitvoert | goed | fout |
|--|------|------|
| - Brengt het heparineslot aan | | |
| - - Koppelt de spuit met heparine-oplossing aan op de connector op de poortstelsysteemnaald. | 0 | 0 |
| - Fixeert de poort met de andere hand. | 0 | 0 |
| - Heft afklemming van de poortstelsysteemnaald op en spuit heparine-oplossing in. | 0 | 0 |
| - Laat het poortstelsysteem los en klemt het slangetje af. | 0 | 0 |
| - Verwijdert de lege spuit. | 0 | 0 |
| - Verwijdert (indien aanwezig) het inbrenghulpstukje van de naald. | 0 | 0 |
| - dekt de insteekplaats af met de infuuspleister | | |
| - Legt het slangetje in een S-bocht om spanning te voorkomen. | 0 | 0 |
| - Plakt de poortstelsysteemnaald en het slangetje af met de infuuspleister | 0 | 0 |
| - plakt slangetje wat onder infuuspleister komt af met kleefpleister vast | 0 | 0 |
| - Trekt handschoenen uit | 0 | 0 |
| - Ontsmet handen | 0 | 0 |
| - Noteert datum op infuuspleister | 0 | 0 |

Nazorg

| | | |
|---|---|---|
| - installeert de patiënt in een goede houding | 0 | 0 |
| - Bevraagt de beleving van de patiënt | 0 | 0 |
| - Ruimt materialen op | 0 | 0 |
| - Past handhygiëne toe | 0 | 0 |
| - Noteert tijdstip van aanprikken, gebruikt materiaal, hoeveelheid en concentratie heparine en bevindingen in het verpleegdossier | 0 | 0 |
| - Tekent de zorg af | 0 | 0 |