

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

Verwijderen en vervangen van gastrostomiesonde met ballon
--

score

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
----------------------------------	-------------	-------------

Vorbereiding

De student:

- | | | |
|--|---|---|
| - kan het doel van de zorg verduidelijken:
vervanging van een gastrostomiesonde met ballon | 0 | 0 |
| - zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne (haren bijeen, zuivere schort) | 0 | 0 |
| - verzamelt gegevens over: | | |
| o de zorgvrager (identificatie, toestand, voedingsstatus, eerdere ervaringen,...) | 0 | 0 |
| o datum, toestand stoma en huid rond de gastrostomie | 0 | 0 |
| o indicatie van vervanging:
lekkage, verstopping, medisch voorschrift,... | 0 | 0 |
| o lengte, diameter van de in te brengen sonde
(aanpassing nodig? Eventueel fistellengte meten?) | 0 | 0 |
| - doet juwelen uit | 0 | 0 |
| - wast/ ontsmet de handen | 0 | 0 |
| - verzamelt de benodigdheden: | | |
| o handalcohol | 0 | 0 |
| o gastrostomiesonde met ballon; controleert type, lengte en CH | 0 | 0 |
| o (bijhorende verlengleiding) | 0 | 0 |
| o wateroplosbaar glijmiddel (bv. KY-gel) | 0 | 0 |
| o spuiten met passend aanzetstuk: | | |
| ▪ 1 spuit van 20 ml → water uit oude button te verwijderen | 0 | 0 |
| ▪ 1 spuit van 20 ml → met 5 ml steriel water (balloninhoud - cf. sonde/ verpakking) | 0 | 0 |
| ▪ 1 katheterspuit → voor pH-controle en spoeling | 0 | 0 |
| o optreknaald | 0 | 0 |
| o flacon steriel water of recipiënt met kraantjeswater | 0 | 0 |
| o pH-indicatorpapier → positie controle gastrostomiesonde | 0 | 0 |
| o kompressen | 0 | 0 |
| o bedbeschutting | 0 | 0 |
| o wasgerief: neutrale zeep, washandje, handdoek; eventueel kompressen + fysiologische oplossing | 0 | 0 |
| o evt. huidbeschermend product, bv. Cavilon | 0 | 0 |

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| ○ niet-steriele handschoenen | 0 | 0 |
| ○ nierbekken | 0 | 0 |
| ○ afvalzakje | 0 | 0 |
| - bereidt de kamer voor | 0 | 0 |

Uitvoering

- | | | |
|--|---|---|
| - informeert de zorgvrager | 0 | 0 |
| - respecteert de privacy van de zorgvrager | 0 | 0 |
| - installeert de zorgvrager in een comfortabele houding - rugligging | 0 | 0 |
| - vraagt de zorgvrager de plaats van de gastrostomiesonde te ontbloten of helpt hierbij | 0 | 0 |
| - legt zo nodig een bedbeschutting aan | 0 | 0 |
| - legt op correcte wijze materialen klaar: | | |
| ○ neemt een spuit van 20 ml en trekt steriel water op met optreknaald | 0 | 0 |
| ○ legt pH-indicatorpapier in nierbekken | 0 | 0 |
| - neemt de nieuwe gastrostomiesonde met dezelfde CH: | | |
| ○ opent de verpakking van de gastrostomiesonde | 0 | 0 |
| ○ controleert de ballon door deze te vullen met op de sonde aangeduide hoeveelheid water | 0 | 0 |
| ○ verwijdert het water terug uit de ballon | 0 | 0 |
| - doet niet steriele handschoenen aan | 0 | 0 |
| - verwijdert de oude ballonsonde: | | |
| ○ sluit het dopje van de voedingspoort | 0 | 0 |
| ○ plaatst kompres rond de stoma ter bescherming van de huid | 0 | 0 |
| ○ trekt de inhoud van de ballon op met een spuit van 20 ml | 0 | 0 |
| ○ verwijdert voorzichtig de oude sonde en legt deze in een nierbekken | 0 | 0 |
| - controleert/ observeert de huid rond de fistel | 0 | 0 |
| - wast/verzorgt de huid rond de fistel | 0 | 0 |
| - brengt eventueel een huidbeschermende film aan | 0 | 0 |
| - sluit het dopje op de voedingspoort van de nieuwe sonde | 0 | 0 |
| ○ brengt glijmiddel aan onderkant van de sonde d.m.v. een kompres (evt. bevochtigen met water) | 0 | 0 |
| ○ plaatst de sonde zo ver mogelijk in de stoma | 0 | 0 |
| - houdt de sonde op zijn plaats en vult de ballon opnieuw met de aangeduide hoeveelheid water | 0 | 0 |
| - trekt de sonde voorzichtig naar boven ter controle | 0 | 0 |
| - verwijdert het teveel aan glijmiddel met kompres | 0 | 0 |
| - (bij button: koppelt het aanzetstuk of verlengleiding aan de sonde - en sluit de klem) | 0 | 0 |
| - trekt met een passende spuit maagvocht op | 0 | 0 |

- | | | |
|--|---|---|
| - sluit de klem en verwijdert de spuit | 0 | 0 |
| - spuit een beetje maagvocht op het pH-indicatorpapier | 0 | 0 |
| - vermeldt de pH-waarde: | | |
| pH- waarde tussen 0 – 5,5 = plaatsing in maag | 0 | 0 |
| pH-waarde tussen 4 – 6 = plaatsing in maag | | |
| bij zorgvragers met maagbeschermende medicatie | 0 | 0 |
| - spuit minimaal. 20 à 50 ml water door de voedingspoort | | |
| na opening van de klem | 0 | 0 |
| - sluit de klem en verwijdert de spuit | 0 | 0 |
| - (bij button: ontkoppelt de verlengleiding en) sluit de voedingspoort | 0 | 0 |
| - doet handschoenen uit | 0 | 0 |

Nazorg

- | | | |
|--|---|---|
| - installeert de zorgvrager in een goede houding | 0 | 0 |
| - brengt het bed in orde | 0 | 0 |
| - informeert naar beleving van de zorgvrager | 0 | 0 |
| - ruimt het materiaal correct op: | | |
| - (vermeldt bij button: verlengleiding bewaren op koele en propere plaats) | 0 | 0 |
| - brengt de kamer in orde | 0 | 0 |
| - wast/ ontsmet de handen, cf. standaardprocedure | 0 | 0 |

Rapportage

- | | | |
|---|---|---|
| - tekent de zorg af in het patiëntendossier | 0 | 0 |
| - rapporteert relevante observatiegegevens over: | | |
| o type, lengte en CH gastrostomiesonde | 0 | 0 |
| o hoeveelheid ballonvloeistof | 0 | 0 |
| o observatiegegevens fistel | 0 | 0 |
| o de gemeten pH-waarde | 0 | 0 |
| o reacties, zorgen en verlangens van de zorgvrager | 0 | 0 |
| o aandachtspunten of problemen i.v.m. de vervanging | | |
| van de gastrostomiesonde zelf | 0 | 0 |