

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

Verwijderen naald veneus poortsysteem
--

score

Degene die de handeling uitvoert

goed

fout

Vorbereiding

De student :

- kan het doel van het aanprikken benoemen	0	0
- kan mogelijke complicaties benoemen	0	0
- zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne (haren bijeen, zuivere schort)	0	0
- wint informatie in over de patiënt en de toe te dienen zorgen	0	0
- doet juwelen uit	0	0
- wast / ontsmet de handen	0	0
- verzamelt de benodigdheden:		
- handschoenen	0	0
- (plastic) ampul NaCl 0,9% 10 ml	0	0
- steriele kompressen	0	0
- infuuspleister	0	0
- desinfectans, chloorhexidine alcohol 70 %	0	0
- plakker voor spuitherkenning	0	0
- steriele spuit 10 ml	0	0
- steriele optreknaalden	0	0
- ampul heparine-oplossing (op voorschrift)	0	0
- infuuspleister (zo nodig)	0	0
- naaldcontainer	0	0
- vuilbak	0	0

Uitvoering

- Past handhygiëne toe	0	0
- Maakt werkvlak schoon en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik	0	0
- Maak, indien infuustoedieningssysteem is gebruikt voor medicatietoediening, één spuit met NaCl 0,9% klaar en één met heparine-oplossing.		
- Spuit met NaCl 0,9%: zuigt NaCl op en ontluicht spuit	0	0
- Spuit met heparine-oplossing: zuigt heparine uit ampul en ontluicht spuit	0	0

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
----------------------------------	------	------

- Vraagt de patiënt op de rug op bed te gaan liggen of een halfzittende houding aan te nemen	0	0
- Stopt de toediening (volgens gebruiksinstructie van de pomp), klem het slangetje aan de poortsysteemnaald af en sluit (indien aanwezig) het driewegkraantje	0	0
- Trekt de handschoenen aan	0	0
- Verwijdert de infuuspleister van het poortsysteem en de poortsysteemnaald van de huid en werp deze in de afvalbak	0	0
- Overgiet een kompres met alcohol	0	0
- Klemt het slangetje aan de poortsysteemnaald af	0	0
- Windt de alcoholkompres om het (naaldloze) afsluitdopje (connector) en het aansluitpunt met de infuuslang (of driewegkraantje) en maakt deze in één draaiende beweging schoon. Laat drogen.	0	0
- Verwijdert de infuusleiding (en, indien aanwezig, het driewegkraantje) van het (naaldloze) afsluitdopje (connector) aan de poortsysteemnaald. Laat de poortsysteemnaald met het (naaldloze) afsluitdopje (connector) op het alcoholgaasje liggen.	0	0
- Spuit het poortsysteem door met de spuit met NaCl 0,9 %. Raak de aansluitpunten niet aan	0	0
- Koppelt de spuit met heparine-oplossing aan op het (naaldloos) afsluitdopje (connector) op de poortsysteemnaald	0	0
- Doet de poortsysteemnaald in de naaldcontainer	0	0
- Trekt de handschoenen uit	0	0
- Plakt de huid zo nodig af met infuuspleister	0	0
- Ontsmet handen	0	0
- (Noteert datum op infuuspleister)	0	0

Nazorg

- Installeert de patiënt in een goede houding	0	0
- Bevraagt de beleving van de patiënt	0	0
- Ruimt materialen op	0	0
- Past handhygiëne toe	0	0
- Noteert tijdstip van verwijderen, hoeveelheid en concentratie heparine en bevindingen in het verpleegdossier	0	0
- Tekent de zorg af	0	0