



**DE HOGESCHOOL
MET HET NETWERK**

www.pxl.be

PXL-Healthcare

Bachelor in de Verpleegkunde

O&O lijst endotracheale aspiratie

Docent(en)

Miek Hendrix

Lieve Ternier



ENDOTRACHEALE ASPIRATIE (KV handschoen)

De student:

Voorbereiding

- Informeert zich over specifieke toestand patiënt.
- Informeert de patiënt
- Wast de HANDEN!
- Zet de benodigdheden klaar:
 - Aspiratietoestel met leiding en fingertip
 - Spoelvloeistof
 - Aspiratiesonden (maat afhankelijk van de maat van de ET)
 - Steriele handschoen (speciale verpakking/één handschoen)
 - Kiemarme handschoenen
 - Vuilzakje
- Doet kiemarme handschoenen aan
- Gaat na of een patiënt met een cranio-cerebraal trauma voldoende gesedeerd en/of gecurariseerd is
- Evacueert eventueel overtollig maagvocht
- Hyperoxygeneert patiënt

Werkwijze

- Stelt zich rechts van de patiënt op (monitoring)
- Doet een beschermbril en neus-mondmasker aan
- Opent aspiratiesonde peel-o-pack bovenaan
- Bevestigt aspiratiesonde stevig aan de connector
- Legt sonde met verpakking op de buik van de patiënt
- Fixeert leiding tussen het bed en eigen lichaam
- Neemt steriele handschoen uit de buitenverpakking
- Plaatst steriele binnenverpakking met handschoen onder de kin van de patiënt

- Fixeert met de linkerduim de steriele handschoen onderaan terwijl student de handschoen aan de rechterhand aandoet
- Verwijdert met de linkerhand de verpakking van de aspiratiesonde en neemt tegelijkertijd de sonde over met de rechter steriele hand.
- Koppelt met de linkerhand de swivel los of opent swivel (Adem inhouden)
- Neemt met de linkerhand de leiding van het aspiratietoestel op, **kort bij de connectie (fingertip controle)** met de aspiratiesonde
- Fixeert met de linkerhand eveneens de ET
- Brengt de aspiratiesonde met de rechter steriele hand niet aspirerend in, tot weerstand voelbaar is.
- Doet dit op **steriele wijze** en voldoende **vlot**
- Trekt de sonde 1 cm terug en begint dan te aspireren
- Verwijdert voorzichtig de sonde aspirerend en licht draaiend
- Controleert monitoring van de patiënt (HR, ABP,...)
- Observeert geaspireerde secreties
- Sluit swivel terug aan of sluit klep
- Spoelt leiding door met voorziene spoelvloeistof
- Trekt handschoen over de sonde en werpt deze weg
- Controleert verder monitoring van de patiënt (beademingsparameters, thoraxexpansie,...)

Nota: eventueel urgente medicatie (vb. Atropine® bij optreden van bradycardie tijdens aspiratie)

Nazorg

- Brengt pat. in een comfortabele houding
- Ruimt materialen op
- Wast de handen
- Rapporteerde in het verpleegdossier