



**DE HOGESCHOOL  
MET HET NETWERK**

[www.pxl.be](http://www.pxl.be)

# PXL-Healthcare

Bachelor in de Verpleegkunde

## O&O lijst tracheostomiezorg

### Docent(en)

Miek Hendrix

Lieve Ternier

[ Geef hier extra informatie ]



## TRACHEOSTOMIEZORG

De student:

### Vorbereiding

- Informeert zich over de specifieke toestand van de patiënt
- Informeert de patiënt
- Informeert zich over de specifieke richtlijnen van de afdeling
- Wast de HANDEN
- Zet de benodigdheden klaar:
  - Verbandwagen
  - Kiemarme handschoenen
  - Set heekunde
  - Extra steriele compressen (5x5)
  - Extra steriele compressen (10x10)
  - Extra steriele pincet
  - 1 steriele aspiratiehandschoen
  - Steriele Metalline® tracheostomie splitcompres
  - Nieuw fixatielint
  - Steriel verpakte binnencanule
  - Zuurstofwater
  - 2 flacons miniplasco NaCl 0,9%

### Werkwijze

#### *Vorbereidende handelingen*

- Identificeert de juiste patiënt
- Ontsmet de handen
- Opent de heekunde set
- Legt het steriele veld klaar
- Legt de deppers in het steriele veld
- Legt een extra steriele pincet klaar
- Giet zuurstofwater in het compartiment van de blister waar de deppers zaten
- Opent 1 flacon NaCl 0,9% en giet dat in het kleine compartiment van de blister
- Opent de 2<sup>de</sup> flacon NaCl 0,9% en zet de flacon klaar langs het steriele veld
- Legt extra steriele compressen 5x5 op het steriele veld
- Opent de steriele compressen met de 2 pincetten
- Legt een steriele Metalline® compres in het steriele veld
- Legt een nieuw fixatielint, buiten het steriele veld klaar

#### *Vorbereiding van de patiënt*

- Legt een onderlegger onder het hoofd van de patiënt
- Opent de kledij van de patiënt een beetje, zodat die niet bevuild wordt

### ***Vervangen van de binnencanule***

- Trekt kiemarme handschoenen aan
- Evacueert eventueel overtollig maagvocht
- Hyperoxygeneert de patiënt
- Haalt de gereinigde canule uit de verpakking
- Ontkoppelt de O<sub>2</sub> of beademing
- Verwijdert de binnencanule, door de canule een kwart naar links te draaien (tegen de wijzers van de klok – bied tegendruk op het halsplaatje!)
- Legt de vuile canule in het compartiment met zuurstofwater
- Brengt de gereinigde canule bij de patiënt in, en sluit de canule door hem een kwartslag naar rechts te draaien (met de wijzers van de klok mee)
- Koppelt de zuurstof terug aan
- Controleert herstel beademing

### ***Wondzorg***

- Koppelt 1 kant van het fixatielint los
- Blijft steeds het halsplaatje fixeren!
- Reinigt de bovenkant van de tracheostoma met een depper, bevochtigd met NaCl 0,9%
- Doet hetzelfde met de onderkant
- Droogt de bovenkant van de tracheostoma met een droge depper
- Doet het zelfde met de onderkant
- Neemt de nieuwe splitcompres uit het steriele veld en plaats die voorzichtig rond de tracheostoma
- Doet het fixatielint aan de andere kant ook los en verwijdert het fixatielint
- Neemt het nieuwe fixatielint en maakt het aan beiden kanten vast

### ***Reinigen van de binnencanule***

- Schuift het steriele veld wat omhoog
- Legt de aspiratiehandschoen klaar en doet deze aan, aan de niet-dominante hand
- Neemt met de steriele handschoen de canule uit het zuurstofwater
- Neemt met de pincet 1 compres 5x5 en maakt deze nat in het zuurstofwater
- Trekt het opengeplooid compres door de canule
- Droogt nog eens na met een droge compres
- Spoelt de canule af met de 2<sup>de</sup> flacon NaCl 0,9% (buiten- en binnenkant)
- Trekt een droge compres door de canule
- Neemt een compres 5x5 en droogt de buitenkant van canule
- Legt de gereinigde canule in het steriele veld

- Verwijdert de steriele handschoen
- Opent de verpakking van de compressen 10x10
- Maakt met de steriele pincet plaats tussen de 2 compressen
- Plaatst de gereinigde canule tussen die 2 compressen en sluit de verpakking

### ***Nazorg***

- Breng de patiënt in een comfortabele houding
- Ruimt de materialen op
- Wast de handen
- Rapportteert in het verpleegdossier