

Oefen- en observatielijst: Navelverzorging

Vorbereiding

Materiaal:	volledig – niet volledig	
<input type="radio"/> omgevingstemperatuur (20-23°C)	0	0
<input type="radio"/> een veilige en gezonde werkomgeving (tochtvrij)	0	0
<input type="radio"/> handontsmettingsvloeistof	0	0
<input type="radio"/> steriele kompressen (5stuks) of steriel navelsetje	0	0
<input type="radio"/> fysiologisch water (uni-dosis)	0	0
<input type="radio"/> navelbandje of netverband of windel	0	0
<input type="radio"/> nierbekken	0	0
<input type="radio"/> eventueel desinfectantia (bv. HAC 1%) en een doek om het zorgkussen te desinfecteren	0	0
<input type="radio"/> eventueel ook het materiaal om een babybadje uit te voeren (zie procedure: babybadje) of detailzorgen (zie procedures hieromtrent) te verrichten.	0	0

Baby:	toegepast – niet toegepast	
<input type="radio"/> baby op het verzorgingskussen	0	0

• Verpleegkundige:	toegepast – niet toegepast	
<input type="radio"/> draag korte mouwen	0	0
<input type="radio"/> juwelen verwijderen	0	0
<input type="radio"/> raadpleeg babyfiche	0	0
<input type="radio"/> licht de ouder in	0	0
<input type="radio"/> handhygiëne volgens procedure	0	0

Werkwijze	toegepast – niet toegepast	
<input type="radio"/> set op een propere werkoppervlak (ev. desinfecteren) leggen	0	0
<input type="radio"/> open steriele kompressensetje of navelsetje, steriel	0	0
<input type="radio"/> kompres per kompres met de 4 hoeken naar elkaar toe opnemen (= zuivere zorg / is geen steriele zorg)	0	0
<input type="radio"/> reinig met fysiologisch water de navelstomp klem en omgeving rond de navel	0	0
<input type="radio"/> droog de navelstomp, klem en omgeving	0	0
<input type="radio"/> steriele kompres rond de navelstomp leggen	0	0
<input type="radio"/> fixeer de kompres (navelbandje/ netverband/ windel)	0	0
<input type="radio"/> eventueel bovenrand van de luier omplooiën	0	0
<input type="radio"/> baby terug in zijn wieg leggen of aan 1 van de ouders geven	0	0
<input type="radio"/> enkel bij tekenen van infectie (rubor, dolor, calor, tumor en functio laesie) desinfecteren met een alcoholische oplossing.		
<input type="radio"/> Neem ook contact op met de behandelende arts.		

Nazorg

- | | | |
|--|---|---|
| • het gebruikte materiaal opruimen en de omgeving terug in orde brengen. | 0 | 0 |
| • observaties rapporteren op de babyfiche in het dossier | 0 | 0 |
| ○ tekenen van infectie | | |
| ○ het droog zijn van de navelstrengstomp | | |
| ○ gedrag van de baby | | |